Robert Dr. Jung, Dr. PhD, Biochemiker ■ 21 Apr 3 · 19 Minuten Lesezeit

Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie enthüllt Graphenoxid in CoV-19-Impfstoffen

Veröffentlicht: 21. April 2021
Autor: Robert Dr Young PhD, MSc, DSc, PhD, Naturheilpraktiker
www.drrobertyoung.com

Plasmonkontrastmikroskopie, Transmissions- und Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersive Röntgenspektroskopie zeigen die Inhaltsstoffe in den CoV-19-Impfstoffen!

Abbildung 1: Plasmonkontrastmikroskopie, Transmissions- und Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersive Röntgenspektroskopie zeigen die Inhaltsstoffe in den CoV-19-Impfstoffen! Graphenoxid in der Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoff, der Moderna-Lonza mRNA-1273-Impfstoff, der Serum Institute Oxford Astrazeneca-Impfstoff und der Janssen COVID-19-Impfstoff, auch bekannt von Janssen Biotech Inc., einem Janssen Pharmaceutical Company von Johnson & Johnson, einem rekombinanten, replikationsinkompetenten Adenovirus Typ 26, das das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert. Der beobachtete Zweck dieser Impfstoffe ist die Immunität gegen das in genomische mRNA-Sequenz neuartige Coronavirus oder SARS-CoV - 2 Virus, das SARS-CoV - 19 genannt wird. Diese im Pharmakonzernen haben es sich zur Aufgabe und/oder Meinungen Inhaltsstoffe, die in diesen sogenannten Impfstoffen enthalten sind, keine vollständige FDA-Offenlegung auf ihrer Impfstoffetiketten, kein Datenblatt oder Etikett vorgelegt. Der Zweck dieses Forschungsartikels besteht darin, die spezifischen Haupt und Nebenbestandteile des Pfizer-Impfstoffs, des Moderna-Impfstoffs, des Astrazeneca-Impfstoffs und des Janssen-Impfstoffs anhand verschiedener wissenschaftlicher anatomischer, physiologischer und funktioneller Tests für jeden SARS-COV-2-Impfstoff zu identifizieren. Als Menschenrecht, das dem Nürnberger Kodex von 1947 unterliegt, sind die Informationen über die Inhaltsstoffpräparaten Inhaltsstoffe kritisch, erforderlich und notwendig, damit jeder Mensch aus jedem Land der Welt eine fundierte Entscheidung treffen kann, ob er der SARS-CoV-2-19 Impfung zustimmt oder nicht. Wir haben die wissenschaftlichen Tests für jeden Impfstoff durchgeführt und mehrere Inhaltsstoffe oder Zusatzstoffe identifiziert, die nicht offengelegt wurden und in diesen vier SARS-CoV - 2-19 Impfstoffen enthalten sind. Derzeit werden diese Impfstoffe Millionen von Menschen auf der ganzen Welt im Rahmen einer Notfallgenehmigung (EUA) verabreicht, die von jedem Land ohne vollständige Offenlegung der Inhaltsstoffe ausgestellt und in einigen Fällen von Regierungen oder Arbeitgebern verlangt werden, die individuellen Menschenrechte unter allen Kontrollen aktiviert und Referenzmessungen durchgeführt, um validierte Ergebnisse zu erhalten.

Zusammenfassung

Derzeit gibt es vier große Pharmaunternehmen, die einen SARS-CoV-2 herstellen, der jetzt SARS-CoV-19 Impfstoff genannt wird. Diese Hersteller sind ihr Impfstoff und Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoff, der Moderna-Lonza mRNA-1273-Impfstoff, der Serum Institute Oxford Astrazeneca-Impfstoff und der Janssen COVID-19-Impfstoff, auch bekannt von Janssen Biotech Inc., einem Janssen Pharmaceutical Company von Johnson & Johnson, einem rekombinanten, replikationsinkompetenten Adenovirus Typ 26, das das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert. Der beobachtete Zweck dieser Impfstoffe ist die Immunität gegen das in genomische mRNA-Sequenz neuartige Coronavirus oder SARS-CoV - 2 Virus, das SARS-CoV - 19 genannt wird. Diese im Pharmakonzernen haben es sich zur Aufgabe und/oder Meinungen Inhaltsstoffe, die in diesen sogenannten Impfstoffen enthalten sind, keine vollständige FDA-Offenlegung auf ihrer Impfstoffetiketten, kein Datenblatt oder Etikett vorgelegt. Der Zweck dieses Forschungsartikels besteht darin, die spezifischen Haupt und Nebenbestandteile des Pfizer-Impfstoffs, des Moderna-Impfstoffs, des Astrazeneca-Impfstoffs und des Janssen-Impfstoffs anhand verschiedener wissenschaftlicher anatomischer, physiologischer und funktioneller Tests für jeden SARS-COV-2-Impfstoff zu identifizieren. Als Menschenrecht, das dem Nürnberger Kodex von 1947 unterliegt, sind die Informationen über die Inhaltsstoffpräparaten Inhaltsstoffe kritisch, erforderlich und notwendig, damit jeder Mensch aus jedem Land der Welt eine fundierte Entscheidung treffen kann, ob er der SARS-CoV-2-19 Impfung zustimmt oder nicht. Wir haben die wissenschaftlichen Tests für jeden Impfstoff durchgeführt und mehrere Inhaltsstoffe oder Zusatzstoffe identifiziert, die nicht offengelegt wurden und in diesen vier SARS-CoV - 2-19 Impfstoffen enthalten sind. Derzeit werden diese Impfstoffe Millionen von Menschen auf der ganzen Welt im Rahmen einer Notfallgenehmigung (EUA) verabreicht, die von jedem Land ohne vollständige Offenlegung der Inhaltsstoffe ausgestellt und in einigen Fällen von Regierungen oder Arbeitgebern verlangt werden, die individuellen Menschenrechte unter allen Kontrollen aktiviert und Referenzmessungen durchgeführt, um validierte Ergebnisse zu erhalten.

Methodik und Techniken

Es wurden vier "Impfstoffe" angesammelt, Pfizer-BioNtech, Moderna-Lonza mRNA-1273 Impfstoff, Vaxzevria von Astrazeneca, Janssen von Johnson & Johnson, unter Verwendung verschiedener Instrumente und Vorbereitungsmethoden nach neuen nanopartikelbezogenen Ansätzen. Die verschiedenen Instrumente umfassen optische Mikroskope, Hellfeldmikroskopie, pHase-Kontrastmikroskopie, Dunkelfeldmikroskopie, UV-Absorption und Fluoreszenzspektroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, Transmissionselektronenmikroskopie, Energiedispersive Spektroskopie, Röntgenfluoreszenz und Kernmagnetresonanzinstrumente wurden verwendet, um die Morphologien und chemischen Signaturen von "Impfstoffen" zu charakterisieren. Für die High-Tech-Messungen und die Durchführung der Untersuchungen wurde die Kontrollen aktiviert und Referenzmessungen durchgeführt, um validierte Ergebnisse zu erhalten.

Live-Blutproben-kontrast und Dunkelfeldmikroskopie

Anschließend wurden Bilder der wässrigen Fraktionen der Impfstoffe gewonnen, um das mögliche Vorhandensein von Kohlenstoffpartikeln oder Graphen visuell zu bewerten.

Die Beobachtungen unter optischer Mikroskopie ergaben eine die Fülle transparenter 2D-Lamininstrukturen, die eine große Ähnlichkeit mit Bildern aus der Literatur zeigen (Su et al, 2019) und mit Bildern aus dem rGO-Standard (SIGMA) (Abbildungen 1, 2 und 3).

Es wurden Bilder von großen transparenten Blättern variabler Größe und Form erhalten, die Wellpappe und flach, unregelmäßig sind. Kleinere Blätter mit polygonalen Formen, die auch den in der Literatur beschriebenen Flecken ähneln (Su et al, 2019), können mit der pHase-Kontrast und Dunkelfeldmikroskopie aufgedeckt werden (Abbildung 3).

Alle diese kleinsten Objekte waren in der wässrigen Fraktion des Blutes (Abbildung 1) oder der Impfstoffe (Abbildungen 2 und 3) verteilt und erscheinen, und mit diesen Blättern kann keine im eingetragenen Patent beschriebene Komponente in Verbindung gebracht werden.

In Abbildung 1 können Sie sehen, wie eine Clusterbombe aus reduziertem Graphenoxid (rGO) im lebenden, ungefleckten menschlichen Blut nach einer CoV-19-Impfung aussieht, die eine potentielle Blutgerinnung verursacht!! !![1][2][3][4][5][7]

Abbildung 1: Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie enthüllt Graphenoxid in CoV-19-Impfstoffen! Graphenoxid in der Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoff, der Moderna-Lonza mRNA-1273-Impfstoff, der Serum Institute Oxford Astrazeneca-Impfstoff und der Janssen COVID-19-Impfstoff, auch bekannt von Janssen Biotech Inc., einem Janssen Pharmaceutical Company von Johnson & Johnson, einem rekombinanten, replikationsinkompetenten Adenovirus Typ 26, das das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert.

Abbildung 2: Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie enthüllt Graphenoxid in CoV-19-Impfstoffen! Graphenoxid in der Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoff, der Moderna-Lonza mRNA-1273-Impfstoff, der Serum Institute Oxford Astrazeneca-Impfstoff und der Janssen COVID-19-Impfstoff, auch bekannt von Janssen Biotech Inc., einem Janssen Pharmaceutical Company von Johnson & Johnson, einem rekombinanten, replikationsinkompetenten Adenovirus Typ 26, das das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert.

Abbildung 3: Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie enthüllt Graphenoxid in CoV-19-Impfstoffen! Graphenoxid in der Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoff, der Moderna-Lonza mRNA-1273-Impfstoff, der Serum Institute Oxford Astrazeneca-Impfstoff und der Janssen COVID-19-Impfstoff, auch bekannt von Janssen Biotech Inc., einem Janssen Pharmaceutical Company von Johnson & Johnson, einem rekombinanten, replikationsinkompetenten Adenovirus Typ 26, das das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert.

Was sind die nicht offenbarten Inhaltsstoffe, die in CoV enthalten sind - 19 sogenannte Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- und Janssen-Impfstoffe?

Um diese Frage zu beantworten, wurde ein weniger Teil der Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- und Janssen-Impfstoffe aus jeder obenerwähnten Person entnommen und dann unter einer pHase-Kontrastmikroskope bei 100er, 600x bis 1500x Vergrößerung betrachtet, die anatomische Hinweise auf reduziertes Graphenoxid (rGO) Partikel zeigt, die zur Identifizierung und Überprüfung mit Mikrographen von rGO von Chuvoori et al., 2009 verglichen wurden. [3]

Schritte zur Analyse von wässrigen Impfstofffraktionen

Kühlproben wurden unter sterilen Bedingungen mit laminaren Strömungskammern und sterilisierten Laborgeräten verarbeitet.

Die Analysenschritte waren:

1. Verdünnung in 0.9 % steriler physiologischer Kochsalzlösung (0.45 ml + 1,2 ml)

2. Polaritätsänderungen: 1,2 ml Hexan + 120 ul aber RD1-Probe

3. Extraktion hydrophiler wässriger pHase

4. Scannen der UV-Absorption und Fluoreszenzspektroskopie



Abbildung 4: Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersive Röntgenspektroskopie zeigen die Inhaltsstoffe in den CoV-19-Impfstoffen! Graphenoxid in der Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoff, der Moderna-Lonza mRNA-1273-Impfstoff, der Serum Institute Oxford Astrazeneca-Impfstoff und der Janssen COVID-19-Impfstoff, auch bekannt von Janssen Biotech Inc., einem Janssen Pharmaceutical Company von Johnson & Johnson, einem rekombinanten, replikationsinkompetenten Adenovirus Typ 26, das das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert.

5. Extraktion und Quantifizierung von RNA in der Probe

6. Elektronen und optische Mikroskopie der wässrigen pHase

Die nicht offenbarten Zutaten von Pfizer "Impfstoff"

Die Mikroskopie in den Abbildungen 2 und 3 wurden mit 100X, 600X und 1500X pHase Kontrast, Dunkelfeld und Hellfeld Optische Mikroskopie erhalten [1].

Auf der linken Seite jeder Mikroskopie sehen Sie Mikrographen, die aus der wässrigen Fraktion des Pfizer-Impfstoffs gewonnen wurden, die rGO enthält.

Auf der rechten Seite jedes Mikroskops sehen Sie eine Überanstrommung aus bekannten Quellen, die rGO für die anatomische Validierung enthalten.

Die Beobachtungen unter pHase-Kontrast, Dunkelfeld-, Hellfeldmikroskopie, Transmissions- und Rasterelektronenmikroskopie des Impfstoffprodukts durch Pfizer, einschließlich Impfstoffe produziert von Moderna, Astrazeneca und Janssen zeigen einige Entitäten, die Graphenstrecken sein können, wie unten in Abbildung 3 gezeigt.



Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für Graphenoxid-Blätter, die in Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- und Janssen-Impfstoffen gefunden wurden. Diese Blätter sind in der wässrigen Fraktion der Impfstoffe vorhanden und können mit Graphenoxid-Blättern verglichen werden, die in der Literatur beschrieben wurden (Chuvoori et al., 2009).

Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für Graphenoxid-Blätter, die in Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- und Janssen-Impfstoffen gefunden wurden. Diese Blätter sind in der wässrigen Fraktion der Impfstoffe vorhanden und können mit Graphenoxid-Blättern verglichen werden, die in der Literatur beschrieben wurden (Chuvoori et al., 2009).



Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für Graphenoxid-Blätter, die in Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- und Janssen-Impfstoffen gefunden wurden. Diese Blätter sind in der wässrigen Fraktion der Impfstoffe vorhanden und können mit Graphenoxid-Blättern verglichen werden, die in der Literatur beschrieben wurden (Chuvoori et al., 2009).

Für eine endgültige Identifizierung von Graphen durch TEM ist es notwendig, die Beobachtung durch die strukturelle Charakterisierung zu ergänzen, indem eine charakteristische Elektronenbeugungsanordnation erhalten wird (wie unten in der Abbildung 5" dargestellt [4].



Die Standardprobe, die Graphit oder Graphen entspricht, hat eine sechseckige Symmetrie und im Allgemeinen mehrere konzentrische Sechsecke.



Mit der Transmission Electron Microscopy (TEM) beobachteten wir eine komplizierte Matrix oder ein Netz aus gefalteten transluzenten flexiblen rGO-Platten mit einer Mischung aus dunkleren Mehrschichtaggiomerationen und helleren Falten einfacher Monoschichten, wie in Abbildung 5 dargestellt. [2][3][4]

Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für Graphenoxid-Blätter, die in Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- und Janssen-Impfstoffen gefunden wurden. Diese Blätter sind in der wässrigen Fraktion der Impfstoffe vorhanden und können mit Graphenoxid-Blättern verglichen werden, die in der Literatur beschrieben wurden (Chuvoori et al., 2009).

Die dunkleren linearen Bereiche in Abbildung 5 scheinen eine Kette von Ablagerungen der Blätter und die kürzte Anordnung einzelner Blätter parallel zum Elektronenstrahl zu sein. [5]

Nach dem Netz erscheint eine Dichte die nicht identifizierten abgerundeten und elliptischen Formen formen, die möglicherweise lokchen entspricht, die durch mechanisches Zwingen der rGO-Netzes während der Behandlung entstehen, wie in Abbildung 6 dargestellt.[4] [5]

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für Graphenoxid-Blätter, die in Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- und Janssen-Impfstoffen gefunden wurden. Diese Blätter sind in der wässrigen Fraktion der Impfstoffe vorhanden und können mit Graphenoxid-Blättern verglichen werden, die in der Literatur beschrieben wurden (Chuvoori et al., 2009).

Die Immunantwort auf düstetische, Stoffwechsel-, Umwelt- und genetische organische und anorganische Mikro- und Nanopartikel

Der leuchtend orangenfarbene Blutkreislauf unten ist verletzte Hamsätze aus der Einnahme einer proteinreichen Ernährung mit tierischem Fleisch, Blut und Milchviehfleischlieferungen. Sie



Während Sie sich das Video oben ansehen, stehen Sie jetzt Impfstoffe (Neutrophile machen 2/3 des gesamten weißen Blutbildes aus), die durch das Blutplasma schwimmen. Das Neutrophil von links bewegt sich nach unten, um eine biologische Transformation einer Hefe in Y-Form wie Candida albicans aufzunehmen. Innerhalb von etwas einer Minute wenden Sie sehen, wie diese Neutrophile diese hochgiftige Hefe in Y-Form zurück ins Blutplasma ausstößt.

Tan Fenyang, Ariana Yang-Hartwich, and Craig Gerard Morrison. "Candida albicans biofilms proliferate in the digestive tract of mice undergoing bacterial antibiosis." PLoS pathogens 19.1 (2023): e1011079.

Dies ist die Hauptfunktion von Neutrophilen, um organische und nichtorganische Mikro- und Nanopartikel wie Mikrokatze, Nanoasbest, Bakterien, Hefe, Schimmel und sogar Graphenoxid aufzunehmen, wie in der unten mit rGO auf der rechten Seite und einem neutrophilen Netzstoffelastomer-NET zu sehen ist.

Wieder einmal sind die Neutrophile weiße Blutkörperchen, die versuchen, das Graphenoxid aufzunehmen und zu entfernen, einen toxischen axonen Eingriff in den Körper sogenannten CoV - 2 - 19 Impfstoffen enthalten ist, wie in der Dark Field-Mikrograph unten zu sehen ist!

The image is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Publication info: PLoS Pathog 19(1): e1011079. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1011079 Funding: Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) Discovery Grant RGPIN-2018-04760 to CGM; Canada Research Chairs Program 950-232424 to CGM; Canada Foundation for Innovation John R. Evans Leaders Fund 37146 to CGM; Ontario Ministry of Research and Innovation Early Researcher Award ER17-13-242 to CGM; Canada Graduate Scholarship to ARH; Ontario Graduate Scholarship to ARH. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript. Competing interests: The authors have declared that no competing interests exist.

Energiedispersive Röntgenspektroskopie enthüllt rGO im Pfizer-Impfstoff![5][6][7]

Die Flüssigkeiten des Pfizerimpfstoffs wurde dann mittels der energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDS) auf chemischen und elementaren Gehalt analysiert, wie in **Abbildung 6** gezeigt. Das EDS-Spektrum zeigte das Vorhandensein von Kohlenstoff, Sauerstoff, der die rGO Elemente überspült, sowie Natrium und Chlorid, die die in den **Abbildungen 2, 3, 5 und 6** gezeigte Probe in einer Kochsalzlösung versönnt wurde.

Abbildung 6 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff

Die Quantifizierung von mRNA im Pfizer-Impfstoff

Die Quantifizierung der RNA in der Pfizer-Probe wurde mit konventioneller Fluoreszenz (Fluke) durchgeführt.

Laut NanoDrop1M 2000 Spektrophotometer Kalibrierungsprüfungsbericht (Thermofisher) korreliert das UV-Absorptionsspektrum der gesamten wässrigen Fraktion mit 747 ng/ µl unbekannter absorbierender Substanzen.

Nach der RNA-Extraktion mit kommerziellem Kit (Thermofisher) zeigte die Quantifizierung mit RNA spezifischer QBit®Fluoreszenzsonde (Thermofisher), dass nur 48 ng/µl mit dem Vorhandensein von RNA in Verbindung gebracht werden konnte. Die Spektren war mit dem Peak von rGO bei 270 nm kompatibel.

Nach mikroskopischen Bildern, die hier vorgestellt werden, könnte der größte Teil dieser Absorption auf graphenähnliche Blätter zurückzuführen sein, die in der Flüssigkeitssuspension in der Probe reichlich vorhanden sind.

Die Schlussfolgerungen werden weiter durch eine hohe Fluoreszenz aus der Probe mit einem Maximum bei 340 nm gemäß den Spektren für rGO gestützt. Es muss daran erinnert werden, dass die RNA unter UV-Exposition keine spontane Fluoreszenz zeigt.

Abbildung 7 UV Analyse der wässrigen Fraktion des Pfizer-Impfstoffes [5][7][8][9]

Ultraviolette Fluoreszenzprüfung des Pfizer-Wässerfraktion für reduziertes Graphenoxid (rGO)[6]

Ultraviolette Absorptions und Fluoreszenzspektren wurden mit dem Cytation 5 zellbildgebungsfähigen Multi-Modereingang Spektrophotometer (Biotek) erzielt. Das UV-Absorptionsspektrum bestätigte ein maximalen Peak bei 270 nm, der mit den Vorhandensein von rGO-Partikeln kompatibel ist.

Das UV-Fluoreszenzmaximum bei 340 nm deutet auch auf das Vorhandensein signifikanter Mengen an rGO in der Probe hin (Barea et al, 2019).



Abbildung 8 – UV Absorption und Fluoreszenzspektren wurden mit dem Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader's Spektrophotometer (Biotek) erhalten. Top UV Absorptionsspektrum von reduziertem Graphenoxid (rGO) Nanopartikel in Wasser. Unten Fluoreszenzspektrum von rGO Nanopartikel in Wasser. Beachten Sie, dass die Anregungswellenlänge von 340 nm mit dem Maximum Absorption von rGO übereinstimmt. Bild mit Erlaubnis von Barea et al, 2019.



Abbildung 9 – Das UV-Absorptionsspektrum der wässrigen Fraktion des Pfizer-Impfstoffs zeigt einen Peak bei 270 nm, der mit dem Vorhandensein von reduziertem Graphenoxid (rGO) Nanopartikeln kompatibel ist. Das Spektrum wurde mit dem Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader's Spektrophotometer (Biotek) erhalten.

Die Abbildungen 11 und 12 unten zeigen eine Mikroskopie verschiedener Mikro und Nanopartikel, die in Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Janssen identifiziert wurden, sogenannte "Impfstoffe" und unter einem Environmental Scanning Electron Microscope (ESM) in Verbindung mit einer Röntgenemissionsanalyse eines Energiedispersive Systems (EDS) analysiert wurden, die die Partikelgröße, Zusammensetzungsverteilung und chemische Natur der beobachteten Mikro und Nanopartikel zeigt, die beobachtet werden.[6][7][10]

Abbildung 11 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff



Abbildung 12 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff

Die Abbildungen 13 und 14, unten zeigen eine Mikroskopie verschiedener Mikro und Nanopartikel, die in Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Janssen identifiziert wurden, sogenannte "Impfstoffe" und unter einem Environmental Scanning Electron Microscope (ESM) in Verbindung mit einer Röntgenemissionsanalyse eines Energie Dispersive Systems (EDS) analysiert wurden, die die Partikelgröße, Zusammensetzungsverteilung und chemische Natur der beobachteten Mikro- und Nanopartikel zeigt.

Gibt es Parasiten in den Pfizer "Impfstoffen"?

Ein 50 Mikrometer langlicher Körper, wie in **Abbildung 13**, zu sehen, ist eine scharfe mysteriöse Präsenz im Pfizer-Impfstoff. Es erscheint und wird anatomisch als *Trypanosoma cruzi Parasit* identifiziert, *von dem mehrere Varianten südlich und eine von vielen Ursachen für das erworbene Immunschwächesyndrom oder AIDS ist./ Atlas der menschlichen Parasitologie, 4. Auflage, Lawrence Ash und Thomas Orihel, Seiten 174/ Bis 178] [9]*

Abbildung 13 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff



Abbildung 14 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff

Abbildung 14 identifiziert eine Zusammensetzung von Nanopartikeln einschließlich Kohlenstoff, Sauerstoffsilizium, Schwefel, Aluminium, Chlorid und Stickstoff, die auch in den "Impfstoffen" des CoV-19 zu finden sind.



Abbildung 15 Eigene Analyse von Dr.Meissner

Die Abbildungen 15 und 16 unten zeigen eine Mikroskopie verschiedener Mikro und Nanopartikel, die unter einem Environmental Scanning Electron Microscope (ESM) identifiziert und analysiert wurden, gekoppelt mit einer Röntgenemissionsanalyse eines Energiedispersiven Systems (EDS), die die chemische Natur der beobachteten Mikro- und Nanopartikel und ihre Morphologie offenbart.

Die weißen 2-Mikrometer-Partikel bestehen aus Wismut, Kohlenstoff, Sauerstoff, Aluminium, Natrium, Kupfer und Stickstoff.

Abbildung 16 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff



Abbildung 17 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff

Die Abbildungen 17 und 18, zeigen die Identifizierung von organischen Kohlenstoff-, Sauerstoff- und Stickstoffpartikeln mit einem Aggregat eingebetteter Nanopartikel, einschließlich Wismut, Titan, Vanadium, Eisen, Kupfer, Silizium und Aluminium, die alle in sogenannten **Pfizer-"Impfstoff"** gefunden wurden.

Abbildung 18 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff

Abbildung 19 Eigene Analyse von Dr.Meissner mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) von Pfizer-Impfstoff[5][6][7] Graphenoxid (rGO) Nanopartikel, Chlorid, Natrium und Sauerstoff

Die nicht offenbarten Inhaltsstoffe von Astrazeneca "Impfstoff"

Die Abbildungen 19 und 20 zeigen ein technisches Aggregat aus Eisen, Chrom und Nickel, das auch als Edelstahl von Mikro und Nanopartikeln bekannt ist, die in den **Astrazeneca-"Impfstoff"** eingebettet und identifiziert sind, **der** unter Transmission Electronmikroskopie (TEM) betrachtet und mit einer Röntgenemissionsanalyse eines Energiedispersiven Systems quantifiziert wird, das die chemische Natur der beobachteten Mikro und Nanopartikel und ihre Morphologie offenbart.



Messung 3D-Lage einzel-funktionaler Nano-Partikel (Graphenoxid, Typ1) mit einem Durchmesser von 0,5 µm (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)

Mit dem RTA-Instrument (Röntgenfluoreszenz) wurden die Hilfsstoffe in Astrazeneca-"Impfstoffe" bewertet, die die folgenden Moleküle von Hanbin, Sanofranca, **Polyethylenglykol (PEG)** und Ethylendiaktid identifizierte, die auch in den Pfizer und Moderna-"Impfstoffen" enthalten sind. Die Ergebnisse dieses Tests sind in Abbildung 20 zu sehen.[10]

Die Injektion von PEG- und Ethylendiaktid wird sowohl als krebserregend als auch als genotoxisch bezeichnet.[10] PEG war also einzige Adjuvans, das auf dem Datenblatt mit den Inhaltsstoffen des **Astrazeneca-"Impfstoffs"** angegeben wurde, aber in den "Impfstoffen" von Pfizer und Moderna enthalten ist.

Messung Graphenoxid-Lage Typen und Nanotubes, Graphen/Polyacrylsäure-Typ 1 mit der Nanotube-Lage, die Graphen/Polyacrylsäure-Typ 2 mit der Nanotube-Lage, die Graphen/Polyacrylsäure-Typ 3 mit der Nanotube-Lage, die Graphen/Polyacrylsäure-Typ 4 mit der Nanotube-Lage (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)

Die nicht silberbasierten Janssen "Impfstoff"-Zutaten

Die Abbildungen 22 und 23 zeigen ein organisch-anorganisches Aggregat, das im Janssen "Impfstoff" identifiziert wurde. Die Partikel, bestehen aus Edelstahl und werden mit einem **"Kleber auf Kohlenstoffbasis"** aus nicht-oxidiertem Graphenoxid zusammengeklebt.[11] Dieses Aggregat ist hochmagnetisch und kann einen pathologische Blutgerinnung und die Schaffung von **"The Corona Effect" oder "The Spike Protein Effect"** aus der Degeneration der Zellmembran aufgrund von Wechselwirkungen mit magnetischen Dipolen auslösen.[11] Sie können diese biologischen Reaktionen oder zelltoxischen Transformationen im Lebendblut unter pHtoe-Kontrast und Dunkelfeldelektronikoptik in den Abbildungen 24, 25 und 26 erweisen.[11][12]



Messung 3D-Lage einzel-funktionaler Nano-Partikel (Graphenoxid, Typ1) mit einem Durchmesser von 0,5 µm (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)

Messung 3D-Lage einzel-funktionaler Nano-Partikel (Graphenoxid, Typ2) mit einem Durchmesser von 0,5 µm (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)

Der Corona-Effekt und Spike-Protein-Effekt

Der endogene geschaffene **"Corona-Effekt"** und das **"Spike-Protein"** werden durch chemische und Strahlungsverpolung durch reduziertes Graphenoxid und Mikrowellenstrahlung verursacht.[12]

Messung 3D-Lage einzel-funktionaler Nano-Partikel (Graphenoxid, Typ3) mit einem Durchmesser von 0,5 µm (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)

Messung 3D-Lage einzel-funktionaler Nano-Partikel (Graphenoxid, Typ4) mit einem Durchmesser von 0,5 µm (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)



Messung 3D-Lage einzel-funktionaler Nano-Partikel (Graphenoxid, Typ5) mit einem Durchmesser von 0,5 µm (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)

Die Abbildungen 24 und 25 zeigen "Die CORONA-EFFEKT" auf das roten Blutkörperchen mit Abbildung 26, die **"Die SPIKE-PROTEIN-EFFEKT"** zeigt, die beide durch eine dekompensierte Azidose der Zwischen und dem Gefäßflüssigkeiten aus einem sauren Lebensstil verursacht werden, insbesondere durch die Exposition gegenüber toxischen pulsierenden elektromagnetischen Feldern bei 2,4 gHz oder höher, chemische Verpilzung durch die Nahrung und Wasser, toxische saure Lufterschmutzung, Chem-Trails und eine Nano-Partikelchemische Belastung CuV - 19 Impfung! Bitte überprüfen Sie Ihre Gefäße und falschen Übersetzungen an der Ihr, bevor SIE SICH vorzeitig Schaden zufügen[12]

Die nicht silberbasierten Moderna "Impfstoff"-Zutaten

In den Abbildungen 26 und 27, wurde eine genotoxische Einheit organischer und anorganischer Stoffe identifiziert, die im Moderna-"Impfstoff" enthalten ist. Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und quantifiziert mit einer Röntgenmikroskopie eines Energiedispersivspektrometers (EDS) ergab die chemische Natur der beobachteten Mikro- und Nanopartikel.

Der sogenannte Moderna "Impfstoff" ist ein kohlenstoffbasiertes reduziertes Graphenoxidsubstrat, in das einige Nanopartikel eingebettet sind. Die Nanopartikel bestehen aus Kohlestoff, Stickstoff, Sauerstoff, Aluminium, Kupfer, Eisen und Chlor.[13]

Messung 3D-Lage einzel-funktionaler Nano-Partikel (Graphenoxid, Typ6) mit einem Durchmesser von 0,5 µm (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)



Messung 3D-Lage einzel-funktionaler Nano-Partikel (Graphenoxid, Typ7) mit einem Durchmesser von 0,5 µm (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)

Die Abbildungen 27 und 28 zeigen eine Analyse, die auch unter Transmission Electron Microscopy (TEM) durchgeführt und mit einer Röntgenmikroskopie eines Energiedispersiven Systems (EDS) quantifiziert wurde und die chemische Natur der beobachteten Mikro- und Nanopartikel aufdeckte. Viele Fremdkörper wurden mit einer kugelförmigen Morphologie mit einigen blasenförmigen Hohlräumen identifiziert.

Abbildung 29 zeigt, dass sie aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Silizium, Bor, Cadmium und Selen bestehen. Diese hochgiftige Nanopartikelzusammensetzung und Quantenpunkte von Cadmiumselenid, die zytotoxisch und genotoxisch sind.[14][15]



Messung 3D-Lage der Nanotubes-Oberfläche eines Moderna "Impfstoff" gefunden



Messung 3D-Lage der Graphenoxid-Oberfläche eines Moderna "Impfstoff" gefunden

Messung 3D-Lage der Nanotubes-Oberfläche eines Moderna "Impfstoff" gefunden

Die Abbildungen 30 und 31, weitere Analysen des sogenannten Moderna "Impfstoffs" zeigten einen 100-Mikron-Spinyblast aus reduziertem Graphenoxid-Nanopartikel-Verbundwerkstoffen. Das rGO besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit Kontaminationen von Nanopartikeln von Stickstoff, Silizium, Phosphor und Chlor Chlor.[16]

Messung 3D-Lage der Graphenoxid-Oberfläche eines Moderna "Impfstoff" gefunden

Messung 3D-Lage der Nanotubes-Oberfläche eines Moderna "Impfstoff" gefunden

Die Abbildungen 32 und 33 zeigen reduzierte Graphenoxidartigen Einheiten mit Kohlenstoffbasis im Moderna "Impfstoff", gemischt mit Aggregaten, die mit Aluminiumsilikatnanopartikeln gefüllt sind.[17]

Messung 3D-Lage der Graphenoxid- und Aluminiumsilikat-Oberfläche eines Moderna "Impfstoff" gefunden

Messung 3D-Lage der Nanotubes- und Aluminiumsilikat-Oberfläche eines Moderna "Impfstoff" gefunden

Diskussion

Die SARSCoV2-19-Pandemie veranlasste die pharmazeutische Industrie, neue Medikamente zu entwickeln, die sie Impfstoffe nannten.

Der Wirkmechanismus dieser neuen Medikamente, wie er von den pharmazeutischen Industrie in Verbindung mit dem, was im Datenblatt der Impfstoffprodukte angegeben ist, NICHT klar ist, damit die derzeitigen medizinischen Verbandsvorkehrungen, dass diese neuen Medikamente, die von Pfizer-BioNTech **mRNA-Impfstoff**, dem Moderna **Lonza mRNA-1273-Impfstoff**, dem Serum Institute **Oxford Astrazeneca** Vaccine und dem Janssen **COVID -19** Vaccine, hergestellt von Janssen Biotech Inc., einem Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson, hergestellt werden, **KEINE** Impfstoffe sind, sondern nanotechnologische Medikamente sind, die als gentherapeutische Produkte.

Der Name "Impfstoff" ist wahrscheinlich eine Escamotage (Trickerei), die aus bürokratischen und technokratischen Gründen verwendet wird, um eine dringende Genehmigung zu erhalten, weder alle normalen Regeln ignoriert werden, die für neue Medikamente erforderlich sind, insbesondere für diejenigen, die neue nanotechnologische Mechanismen betreffen, die von Menschen eingenäht und zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte der Welt entwickelt oder erlebt wurden.

Alle diese sogenannten "Impfstoffe" sind potentiell und daher wird die tatsächlichen Inhalt auch für die Käufer gehalten gehalten, die natürlich das Gefühl der Sicherheit gehabt haben. Die Verbraucher (Steuerzahler) haben also keine Informationen darüber, was zu durch Impfung in ihren Körper erhalten. Die Menschheit wird in Dunkeln gehalten, sowohl die beteiligten nanopartikeltechnischen Prozesse die negativen Auswirkungen und die Zeiten des Körpers benötigen, über einen auf allen der möglichen magnetischen, zytotoxischen und genotoxischen Nano-Bio-Wechselwirkungseffekt auf das Blut und die Körperzellen.

Diese aktuelle Forschungsstudie durch direkte Analyse der oben genannten sogenannten "Impfstoffe" mittels nanopartikeltechnischer Instrumente enthüllt einende und lebenserwiderende Informationen über die Wahrheit über den tatsächlichen toxischen sauren Gehalt der sogenannten Impfstoffe.

Die nanotechnische SARSCoV2-19 pharmakologische Einheit Moderna Nano-Antikörper-Biologisches Produkt, das in Graphenoxid-Nanopartikel-Verbundwerkstoffen eingebettet ist, die Graphen/Polyacrylsäure-Typ 1 mit der Nanotube-Lage, die Graphen/Polyacrylsäure-Typ 2 mit der Nanotube-Lage, die Graphen/Polyacrylsäure-Typ 3 mit der Nanotube-Lage, die Graphen/Polyacrylsäure-Typ 4 mit der Nanotube-Lage (Quelle: Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen)

Die Medikamente Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Janssen sind **KEINE** "Impfstoffe", sondern komplexe Graphenoxid-Nanopartikelgruppe verschiedener Nanoelemente, die ein genetisch veränderte Nukleinsäuren der mRNA aus

herrschen oder Versuchten und abgetrennenen menschlichen Stolen Zellen gebunden sind, wo sie dann bestimmt und beschrieben. Wieder einmal sind die Inhaltsstoffe dieser sogenannten Impfstoffe hoch neurotoxisch, cytotoxisch und genotoxisch für Pflanzen, Insekten, Vogel, Tier und menschliche Zellmembranen und deren Genetik, was bereits zu schweren Verletzungen (geschätzt auf über 500 Millionen!) und vieler schließlich zum Tod (geschätzt auf über 35 Millionen) geführt hat.[17][18] bis [55]

Die sogenannten "Experten" oder "medizinischen Wilden" sagen IHNEN, dass CoV 2 - 19 Impfstoffe der EINZIGE Weg sind, um die Ausbreitung von CoV-19 zu stoppen... auch wenn es KEINEN BEWEIS über deren Existenz gibt und KEINE BEWEIS-gibt, dass es sich ausbreitet, wie von der wissenschaftlichen Methode der Koch- oder Rivers-Postulate bestimmt wird[54]



Dass sie sicher sind - trotz der dokumentierten Beweise ist das Gegenteil... [54]

Dass sie wirksam sind - obwohl Millionen von "Doppelgeimpften" Menschen krank werden, ich theoretisch einen NICHT AUSWEISBAREN VIRUS namens CoV -19 ausatmen ... [55] NICHT an einer Pharmakonunkrankheit, sondern an der Angst oder falschen Beweise, die real existieren, mit dem tonischen Säuregehalt von reduzierenden Elektronen, die die genetisch veränderte mRNA an bestimmte Zellen des menschlichen Körpers abgegeben wird, was zu pathologischen Bildungsprozess, Sauerstoffmangel, Hyperkalzie, Hypoxie und dann Tod durch Erstickung führt [56][57][58]

DocS: SIE MÜSSEN MINDESTENS zwei Schüsse PLUS "Booster" bekommen, um ein "normales Leben" zu führen.

Und bald werden sie IHNEN sagen, dass SIE keine andere Wahl haben, als ALLE ihre MAHlzeiten einzuhalten, auch wenn die CDC und andere Regierungen, Universitäten und medizinische Institute schließlich zugeben haben, dass sie KEINE "GOLD STANDARD"-Isolation des CoV - 2 jetzt CoV - 19 Virus genannt haben[55]

Es gibt KEIN CORONA-VIRUS und WAR NIE[56]

Denken Sie daran ...

LASSEN SIE NICHT IHN IHREN IHRE GESUNDHEITSFREIHEIT ENTFERNT!

Es ist IHR Körper, IHR leben und IHRE Wahl!

Wissen ist Macht. Und es ist der Schlüssel zu verstehen, warum die experimentellen CoV-19 Impfstoffe so gefährlich sind - trotz der offiziellen Erzählung der Unternehmensmedien, die jeden unterdrückt und zensiert, der es wagt, sich zu äußern.

Sie haben die Kontrolle über Ihre eigene Gesundheit. Werden Sie nicht Opfer globaler Regierungen und Banksters, die alle dazu drängen, gezwungen werden. Milliarde "Pillenknopf" Bill Gates und Milliardär Big Tech Aktivisten glauben, dass sie wissen, was das Beste für Sie und Ihre Familie ist.

Sie müssen frei entscheiden können, was für Sie das Richtige ist. Lassen Sie sich NICHT von Regierungen und Arbeitgebern zwingen, "zu ihren eigenen Wohl" "vaxxed" zu werden.

Und lassen Sie sich niemals von der Stornierungskultur zu sehr für Ihre Rechte einsetzen!

Um es mit den Worten des großen französischen Arztes und Wissenschaftlers Antoine BeChamp zu sagen: "Es gibt nichts zu Fürchten, das KEIN Element der Wahrheit enthält, und so ist es mit der Keimtheorie". In diesem Fall die Virus, Impfstoff und Immunität[theorie! 59]



Um mehr über Viren, Impfstoffe und die Virustheorie zu erfahren, lesen und studieren Sie bitte A Second Though About Viruses, Vaccines and the HIV AIDS Hypothese. Sie können dieses Buch bestellen unter:

https://www.phinixsciencepublishing.com/sammlungen/bucher-audio-video/products/zweite-gedanken-uber-viren-impfstoffe-und-die-hiv-aids-hypothese-booklet

Lesen und erfahren Sie mehr über Viren, Impfstoffe und die virale Theorie in den folgenden wissenschaftlichen Artikeln[ ] 60][61][62]

1. Scanning & Transmission Electron Microscopy Ergebnisse, die Graphenoxid in CoV-19 Impfstoffen aufdecken - Ein Interview mit Dr. Robert O. Jung

Absolut Bombe und große Enthüllungen darüber, was in den Impfstoffen enthalten ist, mit Verwendung von Elektronen und anderen Arten der Mikroskopie aus der Originalforschung von Dr. Robert Young und sein Team bestätigten, was die Li Quinto Columna-Forscher gefunden haben - toxischer nanotechnischer Gehalt mit zytotoxischer und genotoxischer Wirkung sowie ein identifizierter Parasit. Das ist eine große Offenbarung. Bitte bleiben Sie dran für einen großen Artikel, der dies bei ECC berichtet, in der Zwischenzeit teilen Sie bitte dieses Video weiter!!

https://www.bitchute.com/video/Z2vbYDVuz3Ir/

https://rumble.com/vlorug-elektronenmikroskopie-enthullt-Graphenoxid-in-cov-19-Impfstoffen.html

https://odysee.com/@DrRobertYoung:7/Mikroskopie(Video-zeuRDOVIrbzcwwzaom_0:cf

=DwWdgcSACYVk551qbhAq5pWVsZ0)WI

2. Die epidemischen Kurven der am häufigsten gemeldeten Länder

https://www.drrobertyoung.com/post/world-health-organization-who-publishes-epidemic-curves-of-the-most-reported-countries

3. Schweden folgt der biologischen Wissenschaft NICHT der Politikwissenschaft

https://www.drrobertyoung.com/post/sweden-ist-nach-der-biologischen-Wissenschaft-nicht-der-politischen-Wissenschaft

4. Was passiert in Indien

https://www.drrobertyoung.com/post/what-happened-in-india

5. Überleben der Pest der Korruption

https://www.drrobertyoung.com/post/surviving-the-pest-of-corruption

6. Demontage der virulen Theorie

https://www.drrobertyoung.com/post/demontage-der-viralen-Theorie

7. Corona vor Gericht

https://www.drrobertyoung.com/post/coronavirus-trial-explosion-und-exklusiv

8. Das Havanna-Kuba-Syndrom, verursacht durch gerichtete pulsierende EMF-Mikrowellen

https://www.drrobertyoung.com/post/the-havana-syndrome-pulsating-microwaves

9. CDC gibt JETZT KEINEN "Goldstandard" für die Isolierung für JEDEN Virus zu!

https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus#_ga=2.60=68bc7407b9202ba2507a

10. Antworten auf Informationsfreiheit auf CoV - 2 Jetzt CoV genannt - 19 :

https://www.drrobertyoung.com/post/freedom-of-information-responses-to-question-2

11. Warum Viren nicht existieren!

https://www.drrobertyoung.com/post/warum-Viren-nicht-existieren

12. Bericht 255 | Dr. Robert Young: Alle Krankheiten sind Ausdehnkrise, keine Infektion - Impfstoff Nano ist Biowaffe!

https://www.bitchute.com/video/nfQhs7K55VwK

13. Bericht 255 | Dr. Robert Young: Alle Krankheiten sind Ausdehnkrise, keine Infektion | Die Lipid-Nanopartikel des Impfstoffs wirt Graphen-Plus-Dreidkung und die Zellmembranen und Bindegewebe werden zerstört

https://www.bitchute.com/video/nfQhs7K55VwK/

Boxwelle - es gibt kein COVID-Virus!
https://www.bitchute.com/video/2302106e8cb3/47a18922-c960343e2b/

14. Bericht 255 | Dr. Robert Young: Alle Krankheiten und Ausbildchen, keine Infektion - Impfstoff Nano ist Biowaffe!
https://odysee.com/@RumoldMessner:8/Report-255-Dr.-RobertYoung:6?t=1615290

15. Vergessen Sie alles anderel Schauen Sie sich die NUMMER VON ITEM 42 in Verletzungen und Todesfällen an!
https://www.drrobertyoung.com/post/vergessen-sie-alles-was-sie-glaubten-was-sie-sahen-und-die-zahlen

16. Dr. Robert O. Junges ITNG-Zeugnis

Melden Sie sich für Dr. Young's FREE Newsletter JETZT unter: www.drrobertyoung.com

17. Aktualisierte PDF Datei dieses Artikels:

Referenzen

[1] Ou, L., Song, B., Liang, H. et al. Toxizität von Nanopartikeln der Graphenfamilie für eine allgemeine Übersetzung der Ursprünge und Mechanismen. Sci Rep Environ Health 1, 57 (2016). https://doi.org/10.1186/s41938-016-0018-y

[2] Young RO (2010) Pathologische Bildgebung und die mykotische oxidative Hypothese (MOZI). Int J Impfstoff 2(6): 00048. DOI: 10.15406/ijvv.2016.02.00048

[3] Xu et al. (2019) Identifizierung von Graphenoxid und seinen strukturellen Merkmalen in Lösungsmitteln durch optische Mikroskopie, RSC Adv., 9 , 18559-18564

[4] Establishing RNA-Kit https://www.fisheries.noaa.gov/products/ambion-purelink-rna-mini-kit#.YJ1O3OYRG3

[5] Nano-DropTM https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ND-2000#/ND-2000

[6] Gu, Z. et al. (2019. Erforschung der Fluoreszenzeigenschaften von reduziertem Graphenoxid mit abstimmbarer Gestaltlösung. Diamant und verwandte Materialien, Band 94, 64-68. ISSN 0925-9635.https://doi.org/10.1016/j.diamond.2019.02.021

[7] Binaju, Ravi & Narayanan, Thanagattu & Viswesh, Thothe Neethi. (2018). Neue Fortschritte in der 2D-Elektronik - Katalyse und Sensorik. 10.1201/9781351356220-9.

[8] Chovazzi, M., Thordarson, P. & Stride, J. Gram-skalige Produktion von Graphen und die Grundlage der Schnellverarmungsrate und Exfoliation. Nature Nanotech 4, 30–33 (2009). https://doi.org/10.1038/nnano.2008.365

[9] Atlas der menschlichen Parasitologie, 4. Auflage, Lawrence Ash und Thomas Orihel, Seiten 174 bis 178

[10] Mano, S.S. , Kanehira, K. , Sonezaki, S. , Taniguchi, A. Wirkung der Polyethylenglykolmodifikation von SiO2-Nanopartikeln auf die Zytotoxizität und Expression von Zytokinen in menschlichen Zellen. J Biosci Bioeng. 2012 ; 113 (3): 370-375. 3717. https://doi.org/10.3390/ijms13033703

[11] Srivastava AK, Dwivedi N, Dhand C, et al. Potenzial von graphenbasierten Materialien zur Bekämpfung von COVID-19: Eigenschaften, Perspektiven und Perspektiven. Mater Sci Chem. 2020;152:104585. doi:10.1016/j.mtchem.2020.104585

[12] Young, RO. "Die Auswirkungen elektromagnetischer Frequenzen (EMF) auf die Blut- und das biologische Gelände." https://www.drrobertyoung.com/post/the-effects-electromagnetic-frequencies-emf-on-blood-and-biological-terrain

[13] Gatti AM, Monti A, Valentini L, Montanari S, Gobbi P, et al. (2016) Nanobiosteotoxikum von Partikeln im Blutkreislauf. Grenzen 30: 3.

[14] Nikazar, S., Sivasankarapillai, V.S., Rahdar, A. et al. Überprüfung der Zytotoxizität von Quantenpunkten: ein kurzer Überblick. Biophys Rev 12, 703–718 (2020). https://doi.org/10.1007/s12551-020-00660-3.0

[15] Ritesh Banerjee, Priya Goswami, Manoswini Chakrabarti, Debolina Chakraborty, Ambrea Mukherjee, Anita Mukherjee, Cadmium Selenid (CdSe) Quantenpunkte verursachen Genotoxizität und oxidativen Stress in Allium cepa?Roman, Mutationsforschung/Genetische Toxikologie und Umweltmutagenese, Band 865, 2021, 503338,ISSN 1383-5718, https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2021.503338.

[16] Wanjun Cao, Lin He, Weidong Cao, Xiaoling Huang, Kun Jia, Jingjing Dai, Jongere Fortschritte von Graphenoxid als potenzieller Impfstoffadjuvant und Adjuvans, Acta Biomaterialia, Band 112, 2020, Seiten 14-28, ISSN 1742-7061, https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.06.009 , (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706120303505)

[17] Prägnante Enzyklopädie der Verbundwerkstoffe, Hg. Anthony Kelly, MIT Press, 1989,ISBN-262-11145-4

[18] J. Harinardhan Reddy, José L. Arias, Julian Nicolas and Patrick Couvreur, "Magnetische Nanopartikel: Design und Charakterisierung, Toxizität und Biokompatibilität, pharmazeutische und medizinische Anwendungen", Chemische Bewertungen 2012 ,112 (11), 5818-5878 DOI: 10.1021/cr300068p

[19] US-Abteilung für Gesundheit und menschliche Dienste (1996) Bericht Update: Nebenwirkungen von Impfstoffen, Nebenwirkungen, Gegenanzeigen und Verschreibungsdaten. CDC 45(RR-12): 1-35.

[20] Ottaviani G, Lovezzi AM, Matturri L (2006) Plötzliches Kindstod-Syndrom (SIDS) nach der sechswertigen Impfung: Pathologie bei verstorbenen SIDS Vivchos Arch 448(1): 100-104.

[21] Taylor B, Miller E, Farrington CP, Petropoulos MC, Favot-Mayaud I, et al. (1999) Autismus und Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff: keine epidemiologischen Beweise für einen kausalen Zusammenhang. Lancet 353(9169): 2026-2029.

[22] Demichali V, Kwetk A, Debolini MG, Di Pietrantoj C (2012) Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln bei Kindern. Cochrane Database Syst Rev 2(2): CD004407. Neue Qualitätskontrollmethoden zu Impfstoffen. Mikro- und Nanokontamination 13/13 Copyright ©2016 Gatt et al. Zitat: Gatt AM, Montanari S (2016) Neue Qualitätskontrollstrategien für Impfstoffe. Mikro- und Nanokontamination 1 Impfstoffe Impfstoff 4(1): 00072. DOI: 10.15406/ijvv.2017.04.00072

[23] Carola Bordage, Ingemar Persson, Åke Ortqvist, Ulf Bergman, Jonas F Ludvigsson et al. (2011) Nanopathologie und Autoimmunreaktionen nach der Impfung gegen die pandemische Influenza A (H1N1) in einem monovalenten adjuvantierten Impfstoff: Populationsbasierte Kohortenstudie in Stockholm, Schweden. BMJ 343: d5956.

[24] Johann Loeng R (2013) Neurologische Komplikationen der Impfwiederzugabe nach dem IOM-Bericht 2011 über Nebenwirkungen von Impfstoffen. HRSA, pp. 1-27.

[25] I Tomljanovic, CA Shaw (2011) Aluminium-Impfstoff-Adjuvans: Sind sie sicher? Aktuelle Medizinische Chemie 18 (17): 2630-2637.

[26] Shaw CA, Petrik MS (2009) Aluminiumhydroxid induzieren fokales ox motorischen Defiziten und Motoraxonangeborenen. J Inorg Biochem 103(11): 1555-1562.

[27] Authier FJ, Sauvat S, Christov C, Chariot P, Bobrie G, et al. (2006) ACMG-subsyndrome, durch Impfhilfe induzierte makrophage Myofasziitis bei Ratten und durch den genetischen Hintergrund beeinflusst. Neuromuskulen Disord 16(6): 347-352.

[28] Exley C, Esiri MM (2006) Schwere zerebrale langsame Angiopathie bei Kaninchen mit einem erhöhten Gehirnaluminium in einem Einzeltier von Cannelloid, Cornwall, Großbritannien, Jahresversammlung. J Neurol Neurosurg Psychiatrie 77(7): 877-879.

[29] Willis MS, Savory J (1985) Wasserglaß von Aluminium, Dialysedemenz und Osteomalazia Umweltgesundheitsperspektive 63: 141-147.

[30] Brinth L, Pors K, Theilad AC, Mehlsen J (2015) Verdachtsfällen der nervösen Symptomen Papillomimpfstoffe. Dan Medizin J 62(4): 1-12.

[31] Palmieri B, Puddighe D, Vadalà M, Laurino C, Carrovale C and al. (2015) Schwere somatoforme und dysautonome Syndrome nach der HPV-Impfung: Fallserien und Literaturübersicht. Immunol Res.

[32] Vasoi O, Manti A, Valentini L, Canonico B, Iesacco F, et al. (2016) Umwelt-Nanopartikel werden bei akuter myelischer Leukämie signifikant überexprimiert. Leuk Res 50:50-56.

[33] Astrin J, Sighinolfi GL, Gatti AM, Sabatini M, Colacci M, et al. (2016) Mikro- und Nanopartikel als möglicher pathogenetischer Kofaktoren bei genetischer Krypgladiatorine. Arbeitsmedizin.

[34] F Hansen, L Klimek, F Bittinger, I Hansen, A Gatti, et al. (2008) Metallisches Aluminium Granulom Pathologie 29(4): 311-313.

[35] Gatti AM, Manti A, Valentini L, Montanari S, Gobbi P, et al. (2016) Nano-Biosteotoxikum von Partikeln im Blutkreislauf. Grenzen 30: 3.

[36] Tenzer S, Docter D, Rosfa S, Wlodarski A, Kuharev J, et al. (2011) Die Nanopartikelkrone: sie eine kritische physikalisch-chemische Determinante der menschlichen Blutplasma-Korona: eine umfassende quantitative proteomische Analyse. ACS Nano 5(9): 7155-67.

[37] Radoser Preeti, Andosch A, Hawranek T, Luetz-Meindl U, Vanderzanden M, et al. (2015) Nanopartikel-Wirt-Interaktionen vermittelt allergische Reaktionen des Menschen: Protein-Korona-Charakterisierung und zelluläre Reaktionen. Faserentoxikologie 13: 3.

[38] Cedervall T, Lynch I, Lindman S, Berggård T, Thulin E, et al. (2016) Verständnis der Nanopartikel-Protein-Korona mit Methoden zur Quantifizierung von Wechselkursen und Affinitäten von Proteinen für Nanopartikel. PNAS 104 (9): 2050-2055.

[39] Lynch I, Cedervall T, Lundqvist M, Cabaleiro-Lago C, Linse S and. (2007) Der Nanopartikel-Protein-Komplex als biologische Einheit: eine komplexe Herausforderung für Tiozigaten und Oberflächenwissenschaften für das 21. Jahrhundert. Fortschritte in der Kolloid und Grenzflächenwissenschaft 134-135: 167-174.

[40] Gatti AM, Quaglino D, Signorini GL (2009) Ein morphologischer Ansatz zur Untersuchung der Nanopartikel-Zelleinteraktion. International Journal of Imaging and Robotics 2: 221.

[41] Urban RM, Jacobs JJ, Gilbert JJ, Galante JO (1994) Migration von Korrosionsprodukten aus modularen Hüftprothesen. Partikelkrankheitsrate und histopathologische Befunde. Journal of Bone and Joint Surgery 76(9): 1345-1359.

[42] Kirkpatrick CJ, Barth S, Giesler T, Krump-Konvalinkova V, Peters JK (2002) Pathomechanismen der beeinträchtigten Wundheilung durch metallische Korrosionsprodukte. Mund Kiefer Gesichtschir 6(2): 183-190.

[43] Lee SH, Brennan FR, Jacobs JJ, Urban RM, Ragasa DR, et al. (1997) Ansprechen von Humanen Monozyten/Makrophagen auf Kobalt-Chrom Korrosionsprodukte und Titanpartikel bei Patienten mit vollständigen Gelenkersatz. J Orthop Res 15(1): 40-49.

[44] Shaw CA, Seneff S, Kette SD, Tomljenovic L, Oliver JM, et al. (2014) Aluminiumadjuvantierte Entrapa in biologischen Systemen: Auswirkungen auf anaphylaxe Erkrankungen. Zeitschrift für Autoimmunität 51: 49-67.

[45] Kirkpatrick CJ, Barth S, Giesler T, Krump-Konvalinkova V, Peters JK (2002) Pathomechanismen der beeinträchtigten Wundheilung durch metallische Korrosionsprodukte. Mund Kiefer Gesichtschir 6(2): 183-190.

[46] Lee SH, Brennan FR, Jacobs JJ, Urban RM, Ragasa DR, et al. (1997) Ansprechen von Humanen Monozyten/Makrophagen auf Kobalt-Chrom Korrosionsprodukte und Titanpartikel bei Patienten mit vollständigen Gelenkersatz. J Orthop Res 15(1): 40-49.

[47] Shaw CA, Seneff S, Kette SD, Tomljenovic L, Oliver JM, et al. (2014) Aluminiumadjuvantierte Entrapa in biologischen Systemen: Auswirkungen auf anaphylaxe Erkrankungen. Zeitschrift für Autoimmunität 51: 49-67.

[48] Shaw CA, Kette SD, Davidson RM, Seneff S (2013) Aluminium?Die Rolle bei Interaktionen zwischen ZNS-Immunsystem, die zu neurologischen Störungen führen. Immunforschung 9: 699.

[49] Seneff S, Swanson N, Chen LJ (2015) Aluminium und Glyphosat können synergistisch die Pathologie der Zöliakie induzieren: Verbindung von Darmdysbiose und neuronalen Erkrankungen. Agrarwissenschaften 6(1): 42-70.

[50] Pagoz B, Debelwa E, Ballisi JP, Konan-Kouakou YN, van den Bergh H (2006) Wirkung der Nanopartikelgröße auf die Extravasationen und die photodynamische Aktivität von Mesoporphyrinassoziierten Porphyrin. J Photochem Photobiol B 82(3): 216-222.

[51] Brinth LS, Pors K, Hoppe AG, Badreldin I, Mehlsen J (2015) Ist das chronische Müdigkeitsnumpfsyndrom myalgische Enzephalomyelitis eine relevante Diagnose bei Patienten mit vermuteten Nebenwirkungen auf den humanen Papillomavirusimpfstoff? Internationale Zeitschrift für Impfstoffe und Impfungen 1(3):1-3.

[52] Moss WH, Fuller DV, Harpp DN, Kanaris I, Perrakos J, et al. (2016) Mikrobiota und neurologische Störungen: Ein Bauchgefühl. Biores Open Access 5(1): 137-145.

[53] Sakinov I, Russell SL, Coetsiou L, Antunes M, Brett (2010) Darmmikrobiote in Gesundheit und Krankheit. Physiologische Rev. 90(3): 859-904.

[54] Umbrello G, Esposito S (2016) Mikrobiote und neurologische Krankheiten: potenzielle Auswirkungen von Probiotika. J Transl Med 14(1): 298.

[55] Kinoshita T, Abe KT, Hinano A, Tsunekawa K, Nakaso S, et al. (2014) Peripherie sympathische Neuroadjuvanten bei gegenüber japanischen Makaken (Macaca fuscata) mit einem humanen Papillomavirusimpfstoff. Intern Med 53(19): 2185-2200.

[53] Zhang L, Richards A, Khalil A, Wogram E, Ma H, Young RA, Jaenisch R. SARS-CoV-2 RNA umgekehrt transkribiert und in das menschliche Genom integriert. bioRxiv [Preprint]. 2020 Dez 13:2020.12.12.422516. doi: 10.1101/2020.12.12.422516. PMID: 33330870; PMCID: PMC7743078.

[54] Young, RO, "Vergiss alles andere! Schauen Sie sich die NUMMERN DER VAER zu Verletzungen und Todesfällen an!" https://www.drrobertyoung.com/post/forget-alles-andere-Sie-haben-gehört-nur-auf-die-Zahlen-schauen5

[55] Young, RO, "CDC gibt JETZT KEINEN 'Goldstandard' für die Isolierung für JEDEN Virus zu!" https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-rlässt-jetzt-keinen-Goldstandard-für-die-Isolation-für-jeden-Virus zu

[56] Young, RO, "Die Entstehung des schweren akuten Atemwegssyndroms (Syndrom) oder des SARS- und Corona-Virus oder COVID - 19." https://www.drrobertyoung.com/post/the-genesis-of-severe-acute-respiratory-syndrome-or-sars-corona-virus-or-covid-19

[57] Young, RO, "Was verursacht Sauerstoffentzug des Blutes (DIC) und dann der Lunge (SARS - CoV 2 & 19)?" https://www.drrobertyoung.com/post/was-sauerstoffentbehrung-verursachet

[58] Young RO, Migalko G (2020) Was verursacht Sauerstoffentzug des Blutes (DIC) und dann der Lunge (SARS - CoV 2 & 12)?. Integ Mol Bio Biotechnol 1: 001-007. http://sciaeon.org/articles/What-Causes-Oxygen-Deprivation-of-the-Blood-DIC-and-Then-Lunge-SARS-CoV2and12.pdf

[59] Young RO (2016) Wer hatte den Finger auf die Magie des Lebens - Antoine Bechamp oder Louis Pasteur?. Int J Impfstoff 2(5): 00047. DOI: 10.15406/ijvv.2016.02.00047

[60] Young RO (2016) Zweite Gedanken zu Viren, Impfstoffen und der HIV/AIDS-Hypothese - Teil 1. Int J Vaccines Impfstoff 2(3): 00032. DOI: 10.15406/ijvv.2016.02.00032 **https://medcraveonline.com/IJVV/zweite-Gedanken-über-viren-Impfstoffe-und-die-hiv-aids-hypothese—teil-1.html**

[61] Young RO (2016) Zweite Gedanken zu Viren, Impfstoffen und der HIV/AIDS-Hypothese - Teil 2. Int J Vaccines Impfstoff 2(3): 00034. DOI: 10.15406/ijvv.2016.02.00034 **https://medcraveonline.com/IJVV/zweite-Gedanken-über-viren-impfstoffe-und-die-hivaids-hypothese—teil-2.html**

[62] Young RO (2016) Zweite Gedanken zu Viren, Impfstoffen und der HIV/AIDS-Hypothese - Teil 3 HIV/AIDS und das monomorphe Krankheitsmodell. Int J Impfstoff 2(3): 00035. DOI: 10.15406/ijvv.2016.02.00035 **https://medcraveonline.com/IJVV/zweite-Gedanken-über-viren-Impfstoffe-und-die-hivaids-hypothese—teil-3-hivaids-und-das-monomorphe-krankheitsmodell.html**

Hier ist die PDF-Datei für den obigen Artikel, die Sie mit allen teilen können, die Sie lieben und die Ihnen wichtig sind:

GraphenOxidImpfstoffPapierAktualisiert3.pdf
PDF herunterladen • 4,47 MB

489.396 ansichten 135 Kommentare 66

Neue Beiträge Alle anzeigen



"Keine reaktionsschnellen Dokumente" von jedem Ort...

8.530 14 23



WISSENSCHAFTSTEAM ENTHÜLLT GRAFEN,...

63.406 42 53

Warum Viren nicht existieren!

9.104 81 20

© 2018 von Nadya Migalko - nadyamigalko.com